

医薬品の適応外使用(効能効果が認められていない疾病等への使用)が認められる事例(24.3.16付通知)《厚労省》

【内服薬】について

| 分類 | 一般名 | 主な商品名 | 認められる事例(効能) | |
|-----|--------------------------------|-----------------------|--|---|
| 117 | 精神神経用剤 | クエチアピンフマル酸塩 | セロクエル錠、細粒 | パーキンソン病に伴う幻覚、妄想、せん妄等の精神病症状 |
| 212 | 不整脈用剤 | ビソプロロールフマル酸塩 | メインテート錠、他後発品 | 肥大型心筋症 |
| 217 | 血管拡張剤 | ベラパミル塩酸塩 | ワソラン錠、他後発品 | 肥大型心筋症 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | チクロピジン塩酸塩 | パナルジン錠、-細粒、他後発品 | 心筋梗塞 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | ヒドロキシカルバミド | ハイドレアカプセル | 急性骨髄性白血病 |
| 424 | 抗腫瘍性植物成分製 | エトポシド | ラステットSカプセル、ペプシドカプセル | 急性白血病、慢性骨髄単球性白血病 |
| 612 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | カナマイシン-硫酸塩 | カナマイシンカプセル、-シロップ、-ドライシロップ | 肝性昏睡時の腸管内殺菌 |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | アモキシシリン水和物 | アモキシシリン細粒、-カプセル、アモリン細粒、-カプセル、サワシリン細粒、-錠、-カプセル、パセトシン細粒、-錠、-カプセル、ワイドシリン細粒、アモペニキシンカプセル、他後 | 急性副鼻腔炎 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用する | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | ビブラマイシン錠 | 熱帯熱マラリア、レプトスピラ症、リケッチア感染症、ライム病等のボレリア属感染症、日本紅斑熱、つつが虫病 |
| | | ミノサイクリン塩酸塩 | ミノマイシン錠、-カプセル | 日本紅斑熱 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 塩酸シプロフロキサシン | シプロキサシン錠、他後発品 | 日本紅斑熱、結核、非結核性抗酸菌症、サルモネラ(感染)症、髄膜炎菌感染症 |
| 629 | その他の化学療法剤 | スルファメトキサゾール・トリメプリーム配合 | バクタ配合錠、-顆粒、バクトラミン錠、-顆粒、他後発品 | ノカルジア症 |

医薬品の適応外使用(効能効果が認められていない疾病等への使用)が認められる事例(24.3.16付通知)《厚労省》

【注射薬】について

| 分類 | 一般名 | 主な商品名 | 認められる事例(効能) | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | ケトプロフェン | カピステン筋注、他後発品 | 局所麻酔剤と併用して疼痛部位(トリガーポイント)への局所注 |
| 121 | 局所麻酔剤 | リドカイン塩酸塩 | 静注用キシロカイン、オリベス静注用、オリベス点滴用 | 静脈内区域麻酔 |
| | | ロピバカイン塩酸塩水和物 | アナペイン注2mg/mL、アナペイン注7.5mg/mL | 浸潤麻酔、伝達麻酔 |
| 124 | 鎮けい剤 | 硫酸マグネシウム水和物/ブドウ糖 | 静注用マグネゾール | 心室頻拍 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | アデホス-L コーワ注、トリノシンS注射液、他後発品 | 発作性上室頻拍 |
| 392 | 解毒剤 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | デトキソール静注液 | シスプラチン動脈注射時における副作用軽減目的 |
| 430 | 放射性医薬品 | 3-ヨードベンジルグアニジン(123I) | ミオMIBG-I123 注射液 | パーキンソン病又はレビー小体型認知症の診断のため心筋シンチグラム |
| 611 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | ベンジルペニシリンカリウム | 注射用ペニシリンG カリウム | 脳膿瘍に対して1回400万単位を4時間毎、静脈内投与 壊死性筋膜炎に対して1回200~400万単位を4~6時間毎、静脈内投与 |
| | | クリンダマイシンリン酸エステル | ダラシンS 注射液、他後発品 | 壊死性筋膜炎、毒素ショック症候群に対して静脈内投与 |
| 612 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | アミカシン硫酸塩 | アミカシン硫酸塩注射液、アミカマイシン注射液、他後発品 | 結核 現行の適応症に対し1回で1日量を静脈内投与 |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | アンピシリンナトリウム | ビクシリン注射用 | リステリア症 細菌性髄膜炎に対して1回2gを4時間毎、静脈内投与 |
| | | ゲンタマイシン硫酸塩 | ゲンタシン注、他後発品 | 黄色ブドウ球菌等による感染性心内膜炎に対して他の抗菌剤と併用 |
| | | スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム | ユナシン-S 静注用、ピシリバクタ静注用、他後発品 | 脳膿瘍に対して1回3g~4.5gを6時間毎、静脈内投与 扁桃周囲膿瘍、顎骨周囲の蜂巣炎、喉頭膿瘍、咽頭膿瘍、虫垂炎 |
| | | セファゾリンナトリウム水和物 | セファメジンα注射用、他後発品 | 皮膚・軟部組織感染症に対して1回3gを6時間毎、静脈内投与 |
| | | セフォタキシムナトリウム | クラフォラン注射用、セフォタックス注射用 | 現行の適応症の重症例に対し1回2gを8時間毎、静脈内投与 |
| | | セフトジジム水和物 | モダシン静注用、他後発品 | 細菌性髄膜炎に対し1回2gを4~6時間毎、静脈内投与 |
| | | ピペラシリンナトリウム | ペントシリン注射用、ペンマリン注射 | 発熱性好中球減少症に対し1回2gを8時間毎、静脈内投与 現行の適応症に対し1回3gを6時間毎、静脈内投与 |
| | | メロペネム水和物 | メロペン点滴用バイアル、メロペン点滴用キット、他後発品 | 細菌性髄膜炎に対して1回2gを8時間毎、静脈内投与 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの | ミノサイクリン塩酸塩 | ミノマイシン点滴静注用、他後発品 | 日本紅斑熱 |
| 722 | 機能検査用試薬 | インドシアニングリーン | ジアグノグリーン注射用、オフサグリーン静注用 | リンパ管静脈吻合術時のリンパ管検索に対し手足の皮内・皮下注射 |